

# オフエブ服用日誌 (3ヵ月分)



※毎日ご記入ください。  
※お薬を受け取る際に日誌のご提示をお願い致します。  
記入終了後は外来看護師へご提出ください。

## 大阪はびきの医療センター

患者番号：  
お名前：

記入開始日： 年 月 日

【院外薬局の先生方へ】  
服薬情報提供書は最終頁に添付されています。

2019年10月薬局作成  
2023年2月オフエブチーム改訂  
2024年1月オフエブチーム改訂  
2024年9月オフエブチーム改訂

## はじめに

間質性肺炎と闘う武器の一つとしてオフェブという薬があります。


間質性肺炎という病気やオフェブについて正しく理解し、オフェブを継続して服用できるように一緒に頑張っていきましょう！



## 間質性肺炎について知りましょう

### どんな病気？

肺の間質という部分に様々な原因による炎症が起こり、**間質の壁がだんだんと硬くなって（線維化）、**呼吸がしづらくなる病気を間質性肺疾患といいます。



## 症状は？

### ◇空咳

痰の出ないコンコン  
といった咳が出ます



### ◇労作時の息切れ

階段や坂道の上下りで  
息が切れます



### ◇日常の軽い動作での息切れ

疲れやすくなり、着替えや  
入浴などの日常の動作でも  
息が切れます




\*間質性肺炎は、

動いたときに血液中の酸素の値が下がりやすいのが特徴です。  
動作はゆっくりそして、休憩をしながら動くことが大切です！

## オフエブについて

### オフエブの働きとは？

オフエブは肺が硬くなるのを押さえて呼吸機能の低下を抑制し、**病気の進行を遅らせる**ことを目的としたお薬です



## 副作用は？

オフエブを服用された方に現れやすい副作用は**下痢や吐き気**などの消化器症状です。

### 【下痢】

お薬開始前よりも1日の排便回数が増えたり、便がやわらかい（ドロドロ～水のような状態）と感じている状態です。

便スケール（表1）で「6または7」の便が出た場合には、**下痢時の対応表**に沿って、**下痢止めを服用して早期に下痢を止めましょう**。**栄養不足**になったり**体重減少**にもつながりますので**我慢せずお薬を飲む**ことが大切です。

表1

消化管の 通過時間	非常に遅い (約100時間)	1	コロコロ便		硬くてコロコロの 兔糞状の便
	↑	2	硬い便		ソーセージ状であるが 硬い便
		3	やや硬い便		表面にひび割れのある ソーセージ状の便
	4	普通便		表面がなめらかで柔らかい ソーセージ状、あるいは 蛇のようなとぐろを巻く便	
	↓	5	やや軟らかい便		はっきりとしたしわのある 柔らかい半分固形の便
	6	泥状便		境界がぼけて、ふにゃふにゃの不定形の 小片便 泥状の便	
	非常に早い (約10時間)	7	水様便		水様で、固形物を含まない 液体状の便



スケール  
**6または7**  
の場合には  
**下痢止めを**  
**内服**しましょう

### 【吐き気】

気持ちが悪くなったり、もどしてしまうことがあります。

吐き気が止まらない時は、早期に受診し医師に相談しましょう。



★下痢・吐き気による体重減少が起こる場合があります。日頃から体重測定をして、体重減少がないかを観察しましょう。

早期に副作用に対応し、できるだけオフエブの内服を続けることが大切です。一緒に頑張りましょう！

# オフェブ服用後下痢時の対応表

※主治医指示の下、使用して下さい！

下痢 (便スケール6~7)

下痢止め 1~2錠 (またはカプセル)  
(用量は主治医の判断による)

6時間おき服用開始 ※十分な水分摂取を!!  
(水分摂取不可の場合は受診する)

※下痢止め  
ロペラミド錠  
またはカプセル1mg

## 下痢止め内服開始24時間後

1日4回以上の下痢  
(便スケール6~7) もしくは  
1日3回以内でも

日常生活に支障をきたす場合

1日3回以内の下痢  
(便スケール6~7) で  
日常生活に問題がない場合

下痢がない  
(便スケール1~5)

下痢 (便スケール6~7) が治まるまで下痢止めを服用して下さい

下痢止めの服用を終了

オフェブ休薬  
(治療日誌の記載は継続)

オフェブ継続

下痢止め内服開始  
3日経っても下痢  
(便スケール6~7) が  
改善しない場合、  
ただちに受診※する

下痢止め内服開始  
3日以内の下痢  
(便スケール6~7) が  
改善した場合、  
次回外来受診時に、  
下痢 (便スケール6~7)  
出現を報告

次回外来受診時に、下痢  
(便スケール6~7) 出現を報告

次回外来受診

※予約外来受診時は  
事前に病院へ電話連絡をしてください

オフェブの服用錠数： ( ) mg 1回 ( ) 錠、1日 ( ) 回

オフェブ使用開始前の排便回数（平均）： ( ) 回/ ( ) 日

便秘薬 (薬剤名： ) 1回 ( ) 錠

下痢止め (薬剤名： ) 1回 ( ) 錠


吐き気止め (薬剤名： ) 1回 ( ) 錠

整腸剤 (薬剤名： ) 1回 ( ) 錠 1日 ( ) 回

0	感じない
0.5	非常に弱い
1	やや弱い
2	弱い
3	
4	多少強い
5	強い
6	
7	とても強い
8	
9	
10	非常に強い

※修正Borgスケール：呼吸困難（息切れ）を評価するスケール（尺度）です。

**表2**：息切れ（呼吸困難）の評価



痛みがない

想像できる最大の痛み

※NRS：0が痛みなし、10が想像できる最大の痛みとして、0～10までの11段階に分けて、現在の痛みがどの程度かを指し示す段階的スケールです。

**表3**：お腹の痛み（NRS）

日付(月/日)		10/1	
通院・入院		通院・ <b>入院</b>	
オフェブの服用	朝食後	<input checked="" type="checkbox"/>	
	夕食後	<input checked="" type="checkbox"/>	
	休薬	<input type="checkbox"/>	
体温(°C)		36.7	
体重(kg)		55	
咳(せき)の症状		<b>なし</b> 少・中・多	
息切れの程度(表2参照:0~10)		0	
SpO2 (動脈血酸素飽和度)	安静時 (じっとしている時)	98%	
	労作時 (動いている時)	96%	
食事量(治療開始前を100%として)		100%	
症状の記録	消化器症状	食欲	<b>良</b> 普通・低
		吐き気	有 <b>無</b>
		嘔吐	有 <b>無</b>
		排便	1回
		便の性状 (表1参照:1~7) BSスコア6~7に該当 →下痢時の対応表を参照	5
		お腹の痛み(NRS) (表3参照:0~10)	<b>有(NRS:3)</b> ・ 無
便秘薬服用		0回	
下痢止め服用		0回	
吐き気止め服用		0回	

# 記載見本

服用したらチェックをしましょう  
【注意!!】休薬中もチェックしてください

表2を見て、息切れの評価をしましょう  
【注意!!】  
表にない数字は書かないでください

《じっとしている時》と《動いている時》のSpO2を書きましょう

治療前を100%として、治療開始後の食事量を書きましょう

表1を見て、今のお通じが下痢でないかを確認しましょう  
下痢の場合は、《下痢時の対応表》を見て対応しましょう

お腹の痛みがある場合は、表3を見て痛みを評価しましょう

便秘薬、下痢止め、吐き気止めを服用された場合、服用回数を書きましょう

その他、気になる事や次回外来時に聞きたい事などがあれば書いてください

メモ  
(変更点、検査結果、その他気になる事など)

日付(月/日)		/	/	/	/	
通院・入院		通院・入院	通院・入院	通院・入院	通院・入院	
オフェブの服用	朝食後	□	□	□	□	
	夕食後	□	□	□	□	
	休薬	□	□	□	□	
体温(°C)						
体重(kg)						
咳(せき)の症状		なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	
息切れの程度(表2参照:0~10)						
SpO2 (動脈血酸素飽和度)	安静時 (じっとしている時)	%	%	%	%	
	労作時 (動いている時)	%	%	%	%	
食事量(治療開始前を100%として)		%	%	%	%	
症状の記録	消化器症状	食欲	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低
		吐き気	有・無	有・無	有・無	有・無
		嘔吐	有・無	有・無	有・無	有・無
		排便	回	回	回	回
		便の性状 (表1参照:1~7) BSスコア6~7に該当 →下痢時の対応表を参照				
		お腹の痛み(NRS) (表3参照:0~10)	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無
便秘薬服用		回	回	回	回	
下痢止め服用		回	回	回	回	
吐き気止め服用		回	回	回	回	
メモ (変更点、検査結果、その他気になる事など)						

日付(月/日)		/	/	/	/	
通院・入院		通院・入院	通院・入院	通院・入院	通院・入院	
オフェブの服用	朝食後	□	□	□	□	
	夕食後	□	□	□	□	
	休薬	□	□	□	□	
体温(°C)						
体重(kg)						
咳(せき)の症状		なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	
息切れの程度(表2参照:0~10)						
SpO2 (動脈血酸素飽和度)	安静時 (じっとしている時)	%	%	%	%	
	労作時 (動いている時)	%	%	%	%	
食事量(治療開始前を100%として)		%	%	%	%	
症状の記録	消化器症状	食欲	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低
		吐き気	有・無	有・無	有・無	有・無
		嘔吐	有・無	有・無	有・無	有・無
		排便	回	回	回	回
		便の性状 (表1参照:1~7) BSスコア6~7に該当 →下痢時の対応表を参照				
		お腹の痛み(NRS) (表3参照:0~10)	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無
便秘薬服用		回	回	回	回	
下痢止め服用		回	回	回	回	
吐き気止め服用		回	回	回	回	
メモ (変更点、検査結果、その他気になる事など)						

日付(月/日)		/	/	/	/	
通院・入院		通院・入院	通院・入院	通院・入院	通院・入院	
オフェブの服用	朝食後	□	□	□	□	
	夕食後	□	□	□	□	
	休薬	□	□	□	□	
体温(°C)						
体重(kg)						
咳(せき)の症状		なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	
息切れの程度(表2参照:0~10)						
SpO2 (動脈血酸素飽和度)	安静時 (じっとしている時)	%	%	%	%	
	労作時 (動いている時)	%	%	%	%	
食事量(治療開始前を100%として)		%	%	%	%	
症状の記録	消化器症状	食欲	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低
		吐き気	有・無	有・無	有・無	有・無
		嘔吐	有・無	有・無	有・無	有・無
		排便	回	回	回	回
		便の性状 (表1参照:1~7) BSスコア6~7に該当 →下痢時の対応表を参照				
		お腹の痛み(NRS) (表3参照:0~10)	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無
便秘薬服用		回	回	回	回	
下痢止め服用		回	回	回	回	
吐き気止め服用		回	回	回	回	
メモ (変更点、検査結果、その他気になる事など)						

日付(月/日)		/	/	/	/	
通院・入院		通院・入院	通院・入院	通院・入院	通院・入院	
オフェブの服用	朝食後	□	□	□	□	
	夕食後	□	□	□	□	
	休薬	□	□	□	□	
体温(°C)						
体重(kg)						
咳(せき)の症状		なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	
息切れの程度(表2参照:0~10)						
SpO2 (動脈血酸素飽和度)	安静時 (じっとしている時)	%	%	%	%	
	労作時 (動いている時)	%	%	%	%	
食事量(治療開始前を100%として)		%	%	%	%	
症状の記録	消化器症状	食欲	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低
		吐き気	有・無	有・無	有・無	有・無
		嘔吐	有・無	有・無	有・無	有・無
		排便	回	回	回	回
		便の性状 (表1参照:1~7) BSスコア6~7に該当 →下痢時の対応表を参照				
		お腹の痛み(NRS) (表3参照:0~10)	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無
便秘薬服用		回	回	回	回	
下痢止め服用		回	回	回	回	
吐き気止め服用		回	回	回	回	
メモ (変更点、検査結果、その他気になる事など)						

日付(月/日)		/	/	/	/	
通院・入院		通院・入院	通院・入院	通院・入院	通院・入院	
オフェブの服用	朝食後	□	□	□	□	
	夕食後	□	□	□	□	
	休薬	□	□	□	□	
体温(°C)						
体重(kg)						
咳(せき)の症状		なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	
息切れの程度(表2参照:0~10)						
SpO2 (動脈血酸素飽和度)	安静時 (じっとしている時)	%	%	%	%	
	労作時 (動いている時)	%	%	%	%	
食事量(治療開始前を100%として)		%	%	%	%	
症状の記録	消化器症状	食欲	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低
		吐き気	有・無	有・無	有・無	有・無
		嘔吐	有・無	有・無	有・無	有・無
		排便	回	回	回	回
		便の性状 (表1参照:1~7) BSスコア6~7に該当 →下痢時の対応表を参照				
		お腹の痛み(NRS) (表3参照:0~10)	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無
便秘薬服用		回	回	回	回	
下痢止め服用		回	回	回	回	
吐き気止め服用		回	回	回	回	
メモ (変更点、検査結果、その他気になる事など)						

日付(月/日)		/	/	/	/	
通院・入院		通院・入院	通院・入院	通院・入院	通院・入院	
オフェブの服用	朝食後	□	□	□	□	
	夕食後	□	□	□	□	
	休薬	□	□	□	□	
体温(°C)						
体重(kg)						
咳(せき)の症状		なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	
息切れの程度(表2参照:0~10)						
SpO2 (動脈血酸素飽和度)	安静時 (じっとしている時)	%	%	%	%	
	労作時 (動いている時)	%	%	%	%	
食事量(治療開始前を100%として)		%	%	%	%	
症状の記録	消化器症状	食欲	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低
		吐き気	有・無	有・無	有・無	有・無
		嘔吐	有・無	有・無	有・無	有・無
		排便	回	回	回	回
		便の性状 (表1参照:1~7) BSスコア6~7に該当 →下痢時の対応表を参照				
		お腹の痛み(NRS) (表3参照:0~10)	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無
便秘薬服用		回	回	回	回	
下痢止め服用		回	回	回	回	
吐き気止め服用		回	回	回	回	
メモ (変更点、検査結果、その他気になる事など)						

日付(月/日)		/	/	/	/	
通院・入院		通院・入院	通院・入院	通院・入院	通院・入院	
オフェブの服用	朝食後	□	□	□	□	
	夕食後	□	□	□	□	
	休薬	□	□	□	□	
体温(°C)						
体重(kg)						
咳(せき)の症状		なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	
息切れの程度(表2参照:0~10)						
SpO2 (動脈血酸素飽和度)	安静時 (じっとしている時)	%	%	%	%	
	労作時 (動いている時)	%	%	%	%	
食事量(治療開始前を100%として)		%	%	%	%	
症状の記録	消化器症状	食欲	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低
		吐き気	有・無	有・無	有・無	有・無
		嘔吐	有・無	有・無	有・無	有・無
		排便	回	回	回	回
		便の性状 (表1参照:1~7) BSスコア6~7に該当 →下痢時の対応表を参照				
		お腹の痛み(NRS) (表3参照:0~10)	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無
便秘薬服用		回	回	回	回	
下痢止め服用		回	回	回	回	
吐き気止め服用		回	回	回	回	
メモ (変更点、検査結果、その他気になる事など)						

日付(月/日)		/	/	/	/	
通院・入院		通院・入院	通院・入院	通院・入院	通院・入院	
オフェブの服用	朝食後	□	□	□	□	
	夕食後	□	□	□	□	
	休薬	□	□	□	□	
体温(°C)						
体重(kg)						
咳(せき)の症状		なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	
息切れの程度(表2参照:0~10)						
SpO2 (動脈血酸素飽和度)	安静時 (じっとしている時)	%	%	%	%	
	労作時 (動いている時)	%	%	%	%	
食事量(治療開始前を100%として)		%	%	%	%	
症状の記録	消化器症状	食欲	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低
		吐き気	有・無	有・無	有・無	有・無
		嘔吐	有・無	有・無	有・無	有・無
		排便	回	回	回	回
		便の性状 (表1参照:1~7) BSスコア6~7に該当 →下痢時の対応表を参照				
		お腹の痛み(NRS) (表3参照:0~10)	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無
便秘薬服用		回	回	回	回	
下痢止め服用		回	回	回	回	
吐き気止め服用		回	回	回	回	
メモ (変更点、検査結果、その他気になる事など)						

日付(月/日)		/	/	/	/	
通院・入院		通院・入院	通院・入院	通院・入院	通院・入院	
オフェブの服用	朝食後	□	□	□	□	
	夕食後	□	□	□	□	
	休薬	□	□	□	□	
体温(°C)						
体重(kg)						
咳(せき)の症状		なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	
息切れの程度(表2参照:0~10)						
SpO2 (動脈血酸素飽和度)	安静時 (じっとしている時)	%	%	%	%	
	労作時 (動いている時)	%	%	%	%	
食事量(治療開始前を100%として)		%	%	%	%	
症状の記録	消化器症状	食欲	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低
		吐き気	有・無	有・無	有・無	有・無
		嘔吐	有・無	有・無	有・無	有・無
		排便	回	回	回	回
		便の性状 (表1参照:1~7) BSスコア6~7に該当 →下痢時の対応表を参照				
		お腹の痛み(NRS) (表3参照:0~10)	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無
便秘薬服用		回	回	回	回	
下痢止め服用		回	回	回	回	
吐き気止め服用		回	回	回	回	
メモ (変更点、検査結果、その他気になる事など)						

日付(月/日)		/	/	/	/	
通院・入院		通院・入院	通院・入院	通院・入院	通院・入院	
オフェブの服用	朝食後	□	□	□	□	
	夕食後	□	□	□	□	
	休薬	□	□	□	□	
体温(°C)						
体重(kg)						
咳(せき)の症状		なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	
息切れの程度(表2参照:0~10)						
SpO2 (動脈血酸素飽和度)	安静時 (じっとしている時)	%	%	%	%	
	労作時 (動いている時)	%	%	%	%	
食事量(治療開始前を100%として)		%	%	%	%	
症状の記録	消化器症状	食欲	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低
		吐き気	有・無	有・無	有・無	有・無
		嘔吐	有・無	有・無	有・無	有・無
		排便	回	回	回	回
		便の性状 (表1参照:1~7) BSスコア6~7に該当 →下痢時の対応表を参照				
		お腹の痛み(NRS) (表3参照:0~10)	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無
便秘薬服用		回	回	回	回	
下痢止め服用		回	回	回	回	
吐き気止め服用		回	回	回	回	
メモ (変更点、検査結果、その他気になる事など)						

日付(月/日)		/	/	/	/	
通院・入院		通院・入院	通院・入院	通院・入院	通院・入院	
オフェブの服用	朝食後	□	□	□	□	
	夕食後	□	□	□	□	
	休薬	□	□	□	□	
体温(°C)						
体重(kg)						
咳(せき)の症状		なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	
息切れの程度(表2参照:0~10)						
SpO2 (動脈血酸素飽和度)	安静時 (じっとしている時)	%	%	%	%	
	労作時 (動いている時)	%	%	%	%	
食事量(治療開始前を100%として)		%	%	%	%	
症状の記録	消化器症状	食欲	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低
		吐き気	有・無	有・無	有・無	有・無
		嘔吐	有・無	有・無	有・無	有・無
		排便	回	回	回	回
		便の性状 (表1参照:1~7) BSスコア6~7に該当 →下痢時の対応表を参照				
		お腹の痛み(NRS) (表3参照:0~10)	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無
便秘薬服用		回	回	回	回	
下痢止め服用		回	回	回	回	
吐き気止め服用		回	回	回	回	
メモ (変更点、検査結果、その他気になる事など)						

日付(月/日)		/	/	/	/	
通院・入院		通院・入院	通院・入院	通院・入院	通院・入院	
オフェブの服用	朝食後	□	□	□	□	
	夕食後	□	□	□	□	
	休薬	□	□	□	□	
体温(°C)						
体重(kg)						
咳(せき)の症状		なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	
息切れの程度(表2参照:0~10)						
SpO2 (動脈血酸素飽和度)	安静時 (じっとしている時)	%	%	%	%	
	労作時 (動いている時)	%	%	%	%	
食事量(治療開始前を100%として)		%	%	%	%	
症状の記録	消化器症状	食欲	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低
		吐き気	有・無	有・無	有・無	有・無
		嘔吐	有・無	有・無	有・無	有・無
		排便	回	回	回	回
		便の性状 (表1参照:1~7) BSスコア6~7に該当 →下痢時の対応表を参照				
		お腹の痛み(NRS) (表3参照:0~10)	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無
便秘薬服用		回	回	回	回	
下痢止め服用		回	回	回	回	
吐き気止め服用		回	回	回	回	
メモ (変更点、検査結果、その他気になる事など)						

日付(月/日)		/	/	/	/	
通院・入院		通院・入院	通院・入院	通院・入院	通院・入院	
オフェブの服用	朝食後	□	□	□	□	
	夕食後	□	□	□	□	
	休薬	□	□	□	□	
体温(°C)						
体重(kg)						
咳(せき)の症状		なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	
息切れの程度(表2参照:0~10)						
SpO2 (動脈血酸素飽和度)	安静時 (じっとしている時)	%	%	%	%	
	労作時 (動いている時)	%	%	%	%	
食事量(治療開始前を100%として)		%	%	%	%	
症状の記録	消化器症状	食欲	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低
		吐き気	有・無	有・無	有・無	有・無
		嘔吐	有・無	有・無	有・無	有・無
		排便	回	回	回	回
		便の性状 (表1参照:1~7) BSスコア6~7に該当 →下痢時の対応表を参照				
		お腹の痛み(NRS) (表3参照:0~10)	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無
便秘薬服用		回	回	回	回	
下痢止め服用		回	回	回	回	
吐き気止め服用		回	回	回	回	
メモ (変更点、検査結果、その他気になる事など)						

日付(月/日)		/	/	/	/	
通院・入院		通院・入院	通院・入院	通院・入院	通院・入院	
オフェブの服用	朝食後	□	□	□	□	
	夕食後	□	□	□	□	
	休薬	□	□	□	□	
体温(°C)						
体重(kg)						
咳(せき)の症状		なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	
息切れの程度(表2参照:0~10)						
SpO2 (動脈血酸素飽和度)	安静時 (じっとしている時)	%	%	%	%	
	労作時 (動いている時)	%	%	%	%	
食事量(治療開始前を100%として)		%	%	%	%	
症状の記録	消化器症状	食欲	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低
		吐き気	有・無	有・無	有・無	有・無
		嘔吐	有・無	有・無	有・無	有・無
		排便	回	回	回	回
		便の性状 (表1参照:1~7) BSスコア6~7に該当 →下痢時の対応表を参照				
		お腹の痛み(NRS) (表3参照:0~10)	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無
便秘薬服用		回	回	回	回	
下痢止め服用		回	回	回	回	
吐き気止め服用		回	回	回	回	
メモ (変更点、検査結果、その他気になる事など)						

日付(月/日)		/	/	/	/	
通院・入院		通院・入院	通院・入院	通院・入院	通院・入院	
オフェブの服用	朝食後	□	□	□	□	
	夕食後	□	□	□	□	
	休薬	□	□	□	□	
体温(°C)						
体重(kg)						
咳(せき)の症状		なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	
息切れの程度(表2参照:0~10)						
SpO2 (動脈血酸素飽和度)	安静時 (じっとしている時)	%	%	%	%	
	労作時 (動いている時)	%	%	%	%	
食事量(治療開始前を100%として)		%	%	%	%	
症状の記録	消化器症状	食欲	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低
		吐き気	有・無	有・無	有・無	有・無
		嘔吐	有・無	有・無	有・無	有・無
		排便	回	回	回	回
		便の性状 (表1参照:1~7) BSスコア6~7に該当 →下痢時の対応表を参照				
		お腹の痛み(NRS) (表3参照:0~10)	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無
便秘薬服用		回	回	回	回	
下痢止め服用		回	回	回	回	
吐き気止め服用		回	回	回	回	
メモ (変更点、検査結果、その他気になる事など)						

日付(月/日)		/	/	/	/	
通院・入院		通院・入院	通院・入院	通院・入院	通院・入院	
オフェブの服用	朝食後	□	□	□	□	
	夕食後	□	□	□	□	
	休薬	□	□	□	□	
体温(°C)						
体重(kg)						
咳(せき)の症状		なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	
息切れの程度(表2参照:0~10)						
SpO2 (動脈血酸素飽和度)	安静時 (じっとしている時)	%	%	%	%	
	労作時 (動いている時)	%	%	%	%	
食事量(治療開始前を100%として)		%	%	%	%	
症状の記録	消化器症状	食欲	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低
		吐き気	有・無	有・無	有・無	有・無
		嘔吐	有・無	有・無	有・無	有・無
		排便	回	回	回	回
		便の性状 (表1参照:1~7) BSスコア6~7に該当 →下痢時の対応表を参照				
		お腹の痛み(NRS) (表3参照:0~10)	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無
便秘薬服用		回	回	回	回	
下痢止め服用		回	回	回	回	
吐き気止め服用		回	回	回	回	
メモ (変更点、検査結果、その他気になる事など)						

日付(月/日)		/	/	/	/	
通院・入院		通院・入院	通院・入院	通院・入院	通院・入院	
オフェブの服用	朝食後	□	□	□	□	
	夕食後	□	□	□	□	
	休薬	□	□	□	□	
体温(°C)						
体重(kg)						
咳(せき)の症状		なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	
息切れの程度(表2参照:0~10)						
SpO2 (動脈血酸素飽和度)	安静時 (じっとしている時)	%	%	%	%	
	労作時 (動いている時)	%	%	%	%	
食事量(治療開始前を100%として)		%	%	%	%	
症状の記録	消化器症状	食欲	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低
		吐き気	有・無	有・無	有・無	有・無
		嘔吐	有・無	有・無	有・無	有・無
		排便	回	回	回	回
		便の性状 (表1参照:1~7) BSスコア6~7に該当 →下痢時の対応表を参照				
		お腹の痛み(NRS) (表3参照:0~10)	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無
便秘薬服用		回	回	回	回	
下痢止め服用		回	回	回	回	
吐き気止め服用		回	回	回	回	
メモ (変更点、検査結果、その他気になる事など)						

日付(月/日)		/	/	/	/	
通院・入院		通院・入院	通院・入院	通院・入院	通院・入院	
オフェブの服用	朝食後	□	□	□	□	
	夕食後	□	□	□	□	
	休薬	□	□	□	□	
体温(°C)						
体重(kg)						
咳(せき)の症状		なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	
息切れの程度(表2参照:0~10)						
SpO2 (動脈血酸素飽和度)	安静時 (じっとしている時)	%	%	%	%	
	労作時 (動いている時)	%	%	%	%	
食事量(治療開始前を100%として)		%	%	%	%	
症状の記録	消化器症状	食欲	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低
		吐き気	有・無	有・無	有・無	有・無
		嘔吐	有・無	有・無	有・無	有・無
		排便	回	回	回	回
		便の性状 (表1参照:1~7) BSスコア6~7に該当 →下痢時の対応表を参照				
		お腹の痛み(NRS) (表3参照:0~10)	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無
便秘薬服用		回	回	回	回	
下痢止め服用		回	回	回	回	
吐き気止め服用		回	回	回	回	
メモ (変更点、検査結果、その他気になる事など)						

日付(月/日)		/	/	/	/	
通院・入院		通院・入院	通院・入院	通院・入院	通院・入院	
オフェブの服用	朝食後	□	□	□	□	
	夕食後	□	□	□	□	
	休薬	□	□	□	□	
体温(°C)						
体重(kg)						
咳(せき)の症状		なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	
息切れの程度(表2参照:0~10)						
SpO2 (動脈血酸素飽和度)	安静時 (じっとしている時)	%	%	%	%	
	労作時 (動いている時)	%	%	%	%	
食事量(治療開始前を100%として)		%	%	%	%	
症状の記録	消化器症状	食欲	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低
		吐き気	有・無	有・無	有・無	有・無
		嘔吐	有・無	有・無	有・無	有・無
		排便	回	回	回	回
		便の性状 (表1参照:1~7) BSスコア6~7に該当 →下痢時の対応表を参照				
		お腹の痛み(NRS) (表3参照:0~10)	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無
便秘薬服用		回	回	回	回	
下痢止め服用		回	回	回	回	
吐き気止め服用		回	回	回	回	
メモ (変更点、検査結果、その他気になる事など)						

日付(月/日)		/	/	/	/	
通院・入院		通院・入院	通院・入院	通院・入院	通院・入院	
オフェブの服用	朝食後	□	□	□	□	
	夕食後	□	□	□	□	
	休薬	□	□	□	□	
体温(°C)						
体重(kg)						
咳(せき)の症状		なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	
息切れの程度(表2参照:0~10)						
SpO2 (動脈血酸素飽和度)	安静時 (じっとしている時)	%	%	%	%	
	労作時 (動いている時)	%	%	%	%	
食事量(治療開始前を100%として)		%	%	%	%	
症状の記録	消化器症状	食欲	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低
		吐き気	有・無	有・無	有・無	有・無
		嘔吐	有・無	有・無	有・無	有・無
		排便	回	回	回	回
		便の性状 (表1参照:1~7) BSスコア6~7に該当 →下痢時の対応表を参照				
		お腹の痛み(NRS) (表3参照:0~10)	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無
便秘薬服用		回	回	回	回	
下痢止め服用		回	回	回	回	
吐き気止め服用		回	回	回	回	
メモ (変更点、検査結果、その他気になる事など)						

日付(月/日)		/	/	/	/	
通院・入院		通院・入院	通院・入院	通院・入院	通院・入院	
オフェブの服用	朝食後	□	□	□	□	
	夕食後	□	□	□	□	
	休薬	□	□	□	□	
体温(°C)						
体重(kg)						
咳(せき)の症状		なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	なし・少・中・多	
息切れの程度(表2参照:0~10)						
SpO2 (動脈血酸素飽和度)	安静時 (じっとしている時)	%	%	%	%	
	労作時 (動いている時)	%	%	%	%	
食事量(治療開始前を100%として)		%	%	%	%	
症状の記録	消化器症状	食欲	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低	良・普通・低
		吐き気	有・無	有・無	有・無	有・無
		嘔吐	有・無	有・無	有・無	有・無
		排便	回	回	回	回
		便の性状 (表1参照:1~7) BSスコア6~7に該当 →下痢時の対応表を参照				
		お腹の痛み(NRS) (表3参照:0~10)	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無	有(NRS: ) ・ 無
便秘薬服用		回	回	回	回	
下痢止め服用		回	回	回	回	
吐き気止め服用		回	回	回	回	
メモ (変更点、検査結果、その他気になる事など)						